
دراسة: أصحاب زمرة الدم 0 أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب



وقالت "نيناشيفا" إنه: "عند تعرض أصحاب الزمرة 0 إلى مسببات معينة، فإنهم أقل عرضة لتشكل جلطات دموية، واحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية".

وأضافت "يوجد في دم هؤلاء الأشخاص عدد أقل من مسببات تخثر الدم في عامل التخثر الثامن وعوامل فون ويلبراند".

وأعربت الخبيرة "عن أملها أن تصبح معرفة خصائص فصيلة الدم مسألة ضرورية، لأنه استنادا إلى خصائصها يتم اختيار المواد الغذائية وطرق العلاج والوقاية".

وعامل التخثر الثامن VII Factor-VIII Factor هو عامل أساسي لتخثر الدم المعروف أيضاً بالعامل المكافح لهيموفيليا الدم factor hemophilic-Anti. ويتم ترميز وإنتاج العامل الثامن بواسطة الجين F-8.

أما عامل فون ويل براند factor Willebrand Von، هو سلسلة من بروتين سكري متعدد، وهو كبير نسبياً بالنسبة لعوامل تخثر الدم الأخرى، ويتم تصنيع عامل فون ويل براند في الصفائح الدموية والأنسجة الأندوثيلية المكوّنة للأوعية الدموية على عكس باقي عوامل التخثر التي تصنّع في الكبد.